

E D薬の処方をご希望の患者様へ ～診療の前にお読みいただきたい注意事項～

- ★当院では混合診療をさけるため保険を使つての診療と同日のE D薬の処方はお断りしております。
- ★初回処方時のみ初診料を別途いただきます。
- ★服用している薬がある場合は飲んでいるお薬がわかる物をお持ちください。

以下に該当する方は処方できません

- 1) バイアグラの成分に対し過敏症の既往歴のある方
- 2) 硝酸剤あるいは一酸化窒素（NO）供与剤を服用中の方
（主なものは狭心症、心筋梗塞のニトログリセリンです）
- 3) 心血管系障害を有するなど性行為が不相当と考えられる方
- 4) 不安定狭心症のある方、又は性交中に狭心症を起こしたことのある方
- 5) 重度の肝障害のある方
- 6) 血圧の上昇が90mmHg以下の低血圧の方、治療により管理されていない高血圧の方で安静時に上昇が170mmHg以上、下が100mmHg以上の場合
- 7) 脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヶ月以内にあった方
- 8) 網膜色素変性症（進行性の夜盲症）と診断された方
- 9) 先天的に不整脈（QT延長症候群）がある方 これはレビトラの使用禁忌になります。

上記以外でも診療のうえ院長の判断で処方をお断りする場合がございます。
ご了承ください。

当院で扱っている薬（すべてジェネリック薬です）

- シルденаフィル（バイアグラの後発品）
- バルденаフィル（レトビラの後発品）
- タダラフィル（シリアスの後発品）



あずま泌尿器科クリニック